

ドセタキセルの治療を受けられる方へ

患者氏名(@PATIENTNAME)様

担当医師()

担当看護師()

病日	年月日	1日目(投与後)	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目	7日目	8日目	9日目	10日目	11日目	12日目	13日目	14日目
経過	治療前日	治療当日	治療後												
達成目標		◆副作用が早期に発見できる	◆吐き気なく過ごすことができる	◆吐き気なく過ごすことができる。 ◆口内炎がない。	◆感染予防について理解できる。 ◆発熱がない。										
治療・薬剤	ありません。	デカドロン注30分 ドセタキセル60分で 点滴します。	治療後の内服は指示通り内服してください。												
検査	・治療前に血液検査があります。		適宜血液検査やレントゲン撮影をします。												
安静・活動	・制限はありません。	・基本的にはベッド安静ですが、移動は可能です。	制限はありません。												
栄養	・制限はありません。		制限はありません。												
清潔	・入浴可	・清拭	制限はありません。												
排泄	・制限はありません。		制限はありません。												
教育指導説明	<p>・治療前に薬剤師より薬の説明があります。疑問や不安な点がありましたら、スタッフにお伝え下さい。</p> <p>・お薬が血管の外に漏れないように、点滴中は安静にしてください。</p> <p>・点滴注射中に注射部位が腫れたり、痛みや焼けるような熱さを感じたりするときは、ナースコールを押してスタッフにすぐ教えてください。</p> <p>・点滴中急に息苦しくなったり、胸が苦しくなったり、吐き気がするなど、少しでも気分が悪くなったら、我慢せずナースコールを押してスタッフにすぐ知らせてください。</p>		<p>☆治療による副作用</p> <p>白血球減少 感染しやすくなりますので、手洗いうがいを心掛けましょう。</p> <p>赤血球減少(貧血) 貧血の症状(めまい・ふらつき)がでたりします。転倒に注意しましょう。</p> <p>手足のしびれ 手足のしびれ、感覚が鈍るなどの症状がでることがあります。</p> <p>口内炎 口の中が荒れて痛みが出ることがあります。歯磨き、うがいなど丁寧にしっかり行いましょう。</p> <p>食欲不振 食欲低下や吐き気がすることがあります。食べやすいものを無理なく食べ、水分をとりましょう。</p> <p>血小板減少 出血しやすくなって手足に赤い点やあざがでたり、歯茎から出血することがあります。</p> <p>脱毛 髪質が少し変わることもありますが、治療後半年程度でまた生えてきますので、心配すぎないでください。</p> <p>肝機能低下 体がだるい、食欲がでない、皮膚のかゆみ、皮膚や白目が黄色くなる可能性があります。</p>												
			<p>治療による副作用</p> <p>白血球減少 赤血球減少(貧血) 手足のしびれ 口内炎 食欲不振 血小板減少 脱毛 肝機能低下</p>												
			<p>治療回数が増えると手や足のむくみが生じることがあります。また、爪の変化(爪の変色、爪の周囲の発赤や掻痒感)が生じることがあります。気になる症状がありましたら、お知らせください。</p> <p>* 上の表は副作用の出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。</p> <p>* それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。</p> <p>* 動くときに息苦しさを感ずることがありましたら、看護師か医者にお知らせください。</p>												
			<p>食事でご飯が食べられず、いつも栄養科に相談いたします。遠慮なくスタッフにお伝えください。</p>												
			<p>治療後の内服は指示通り内服してください。</p>												
			<p>適宜血液検査やレントゲン撮影をします。</p>												
			<p>制限はありません。</p>												
			<p>制限はありません。</p>												
			<p>制限はありません。</p>												
			<p>制限はありません。</p>												